FOLFOX療法

| | | | 1サイクル | | | 2サイクル |
|----------|--------------------|-----|-------|---|---|-------|
| | | Day | 1 | 2 | 3 | 15 |
| レボホリナート | 200mg/ m ² | 静注 | 1 | | | 1 |
| エルプラット | 85mg/ m ² | 静注 | 1 | | | 1 |
| フルオロウラシル | 400mg/ m ² | 静注 | 1 | | | 1 |
| フルオロウラシル | 2400mg/ m i | 静注 | | | | |

| 投与サイクル | 2週間毎 | サイクル数 | 憎悪または忍容性がない場合まで継続 |
|--------|------|-------|-------------------|
|--------|------|-------|-------------------|

投与方法

| 薬剤 | 用量 | 投与経路 | 投与時間 | | | |
|---------------------|----------------------------|------|-----------------------|--|--|--|
| 抗がん剤 Day1 | | | | | | |
| アロキシ デカドロン 生食 | 0. 75mg 6. 6mg 100ml | 静注 | 30分 | | | |
| レボホリナート 5%糖液 | 200mg/m² 250ml | 静注 | 120分 (エルプラットと同時投与) | | | |
| エルプラット 5%糖液 | 85mg/m² 250ml | 静注 | 120分 (レボホリと同時投与) | | | |
| 5-FU 生食 | 400mg∕㎡ 100ml | 静注 | 急速静注 | | | |
| 5-FU 生食 | 2400mg/㎡ 適量 | 静注 | 46時間持続 | | | |
| 経口制吐剤 | | | | | | |
| イメンドカプセルセット | 1日目 125mg 2~3日目 80mg | 経口 | 分1 Day1~3 | | | |
| デカドロン | 4mg | 経口 | 分2(朝、夕食後) Day2、3 | | | |